



Medicin til pindsvin.

Her følger nyttige anvisninger vedrørende medicin til pindsvin.

Medicin markedsføres af forskellige firmaer under forskellige navne. Listen angiver derfor de mest almindelige, mens det væsentlige er indholdsstoffet.

Meget medicin fås i forskellige styrker; derfor angives som mængde (mg, mikrogram etc.) pr. vægt. Doserne er høje, men er afprøvet i mange år både her i Danmark, i England og i Tyskland med gode resultater.

Vejledningen er ikke tænkt til, at plejere skal til at "lege dyrlæge", men en hjælp til at vælge den rette behandling i samarbejde med dyrlægen.

Når man skal dosere medicin til pindsvinet, er det nyttigt at opløse medicinen i vand: vælg dosis til 1 kg.

Opløs det i 1 ml vand. Herefter vil dosis være 0,1 ml pr. 100 gr. pindsvin.

Du kan godt runde op, da der ofte er lidt spild i forbindelse med indgivelsen. Opløsningen kan holde sig i 24 timer, når det opbevares køligt.

Din dyrlæge er velkommen til at kontakte os i tvivlstilfælde.

Med venlig hilsen

Søren Kingo Nielsen
Dyrlæge
kingo@kingosdyreklinik.dk
www.kingosdyreklinik.dk
Tlf.: 60 37 91 35

Aslaug Bugge
Pindsvinevennerne i Danmark
aslaug@pindsvin.dk
Tlf.: 40 33 74 09

Antibiotika

Antibiotika er meget lidt giftigt, så anvend hellere for meget end for lidt.

Indholdsstof	Salgsnavne	Virkning	Dosering
Amoxicillin/Clavuante	Clavubactin Noroclav Synolux	Lungeinfektioner, urinveje, hud, tarme, sår Et godt førstevalg til de fleste infektioner	100 mg/kg x 2 dagligt i 5-10 dage 50 mg tabletter: 2 tabletter/kg x 2 i 5-10 dage 250 mg tabletter: ½ tablet/kg x 2 i 5-10 dage Injektion 17,5%: 0,6 ml/kg x 1 dagligt i 5-10 dage
Clindamycin	Antirobe Clinacin	Godt til infektioner i knogler, tandrødder. Balloon Syndrom, bylder	25 mg/kg x 2 dagligt i 7-10 dage, op til 21 dage 25 mg kapsler: 1 kapsel /kg x 2 75 mg tabletter: 1/3 tbl./kg x 2
Enrofloxacin	Baytril	Lungeinfektioner, gamle sår, hundebid Pseudomonas	20 mg/kg x 1 dagligt i 3-10 dage Mixtur 25 mg/ml: 0,8 ml/kg x 1 i 3-10 dage Injektion 50 mg/ml: 0,4 ml/kg x 1 i 3-10 dage Ved pseudomonas gives 2 gange dagligt. Bør kun bruges til udvoksede dyr
Metronidazol	Flagyl	Til tarminfektioner, der ikke klares med Amoxicillin/Clavuante	40 mg/kg x 1 dagligt i 5-10 dage Mixtur 40 mg/ml: 1 ml/kg x 1 dagligt i 5-10 Tabletter 250 mg: 1/6 tablet/kg x 1 dagligt i 5-10 dage
Sulfadiazin/Trimethoprim	Tribriksen Norodine	Tarminfektioner, urinveje Coccidiose Godt førstevalg ved grønne afføringer hos flaskeunger	120 mg/kg x 1 dagligt i 5-10 dage 480 mg tabletter: 1/4 tablet x 1 dagligt i 5-10 dage Injektion 240 mg/ml (24%): 0,5 ml x 1 i 5-10 dage Oral paste til heste (15600 mg/52 g): 0,4 ml/kg x1

Parasit-midler

GIV IKKE FLERE PARASITMIDLER SAMTIDIGT!

Indholdsstof	Navn	Formål	Dosering
Fenbendazol	Panacur	Indvoldsorm, Lungehårsorm, Capillaria Europhila	100 mg/kg x 1 i 5 dage, gentages efter 10 dage Suspension 10% - 100 mg/ml: 1 ml x 1 dagligt Kan suppleres med antibiotika og/eller Bromhexidin
Imidacloprid, moxidectin	Advocate Vet til små katte	Lopper, skab og indvoldsorm: lungeorm og hjerteorm	0,4 mg/kg x 1, ved skab gentages behandling efter 4 uger Pippette til små katte: 1 pipette/kg dryppes i nakken OBS! forsigtighed ved ustabile dyr og unger under 300 gram Give nøje dosis – overdosering kan medføre død Kan suppleres med antibiotika og/eller Bromhexidin
Ivermectin	Ivomec Noromec Pour-on	Indvoldsorm: Lunge- og tarmhårsorm, Capillaria aeorophila/erinaicei og rundorm Skab hos pindsvin	4 mg/kg 3 gange med 1 uges mellemrum Injektion 10 mg/ml: 0,4 ml/kg 3 gange med 1 uges mellemrum (kan blandes med propylene glycol) Pour-on gives i armhulen OBS! forsigtighed ved ustabile dyr og unger under 300 gram Give nøje dosis – overdosering kan medføre død Kan suppleres med antibiotika og/eller Bromhexidin
Praziquantel	Droncit	Bændelorm, leverikter (Fluke)	20 mg/kg x 1 50 mg tabletter: ½ tablet / kg x 1 Må ikke gives sammen med andre ormebehandlinger

Praziquantel/emodepsid	Profender spot-on	Indvoldsorm: Bændelorm, leverikter (Fluke)	50 mg/kg 3 gange med en uges mellemrum Pipetter til kat (107 mg/ml): 0,5 ml/kg Obs! UDVORTES dryppes på huden på bagbenet
Sulfadiazin/Trimethoprim	Tribriksen Norodine Vet	Coccidiose	240 mg/kg x 1 dagligt i 5 dage, pause i 5 dage, gentages 480 mg tabletter: 1/2 tablet x1 dagligt Injektion 240 mg/ml (24%): 1 ml x 1 dagligt Oral paste til heste (15600 mg/52 g): 0,8 ml/kg x1
Phoxim	Sebasil	Lopper, flåter, maddiker	0,2 ml i 50 ml vand i forstøverflaske Sprayes på dyret – virkning indsætter efter 1-2 timer

Smertestillende, binyrebarkhormoner, beroligende, narkose m.m.

Indholdsstof	Navn	Formål	Dosering
Alkohol 38%	Snaps Vodka m.m.	Beroligende	0,5-1 ml/100 gram pindsvin
Meloxicam	Metacam	Smertestillende Cenralstimulerende	0,5 ml/kg x 1 dagligt 0,5 mg/ml suspension: 1 ml/kg dagligt 1,5 mg/ml suspension: 0,35 ml/kg dagligt Må ikke gives sammen med Binyrebarkhormoner
Dexamethason	Flourmetylpredni- solon	Appetitløshed, chok, stress, væskeophobninger	1-5 mg/kg dagligt Injektion: 1-2 ml/kg i.m.
Methylprednisolon	Medrol Vet	Appetitløshed, chok, stress, væskeophobninger	1-5 mg/kg dagligt 4 mg tabletter: ¼ -1 tablet dagligt Må ikke gives sammen med Metacam

Prednisolon	Prednisolon	Appetitløshed, chok, stress, væskeophobninger	1-5 mg/kg dagligt 2,5 mg tabletter: ½-2 tablet dagligt Må ikke gives sammen med Metacam
Isofluran		Narkose	Start i induktionskammer, fortsættes med maske
Zolazepam, Tiletamin + Butorphanol + Xylazin	”katteblanding”	Narkose	Tørstoffet Zolatil tilsættes 10 ml Xylazin (20mg/ml) og 0,75 ml Butorphanol (10mg/ml) Dosis: 1 ml pr. 10-12 kg pindsvin Antidot: Antisedan 0,2 ml/kg

Øjne/ører

Indholdsstof	Navn	Formål	Dosering
Fucidinsyre, framycetinsulfat, nystatin og prednisolon	Canaural Comp øredråber	Betændelse og svamp i ørerne Sårbehandling	2-3 dråber direkte i ører og sår 2 gange dagligt i 5-8 dage
Fucidinsyre	Fucithalmic , øjendråber Fucidinsalve	Øjenbetændelse Sårbehandling	1 dråbe direkte i øjnene x 2 dagligt 5-10 dage Smøres 2 x dagligt i sår
Oxytetracyclin	Terramycin – polymycin B – øjensalve	Øjenbetændelse, lokalt i sår	Direkte i øjne eller sår dagligt i 5-10 dage